

**BIJSLUITER**

## BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

### **Corsodyl tandgel, gel voor oromucosaal gebruik 10 mg/g** chloorhexidine digluconaat

**Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.**

Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Corsodyl tandgel zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

#### **In deze bijsluiter:**

1. Wat is Corsodyl tandgel en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Corsodyl tandgel gebruikt
3. Hoe wordt Corsodyl tandgel gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Corsodyl tandgel
6. Aanvullende informatie

#### **1. WAT IS CORSODYL TANDGEL EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT**

- Corsodyl tandgel bevat chloorhexidine digluconaat. Chloorhexidine digluconaat heeft een bacteriedodende werking en is actief tegen de meeste bacteriesoorten.
- Corsodyl tandgel voorkomt het ontstaan van tandplak en kan reeds bestaande tandplak gedeeltelijk doen verdwijnen.
- Corsodyl tandgel wordt gebruikt:
  - Ter voorkoming van infecties na tandheelkundige en mondchirurgische ingrepen.
  - Voor kortdurende toepassing bij tandvleesontsteking.

#### **2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U CORSODYL TANDGEL GEBRUIKT**

##### **Gebruik Corsodyl tandgel niet**

Als u allergisch (overgevoelig) bent voor chloorhexidine digluconaat, of voor één van de andere bestanddelen van Corsodyl tandgel.

##### **Wees extra voorzichtig met Corsodyl tandgel**

- Hoewel er geen nadelige effecten bekend zijn ten gevolge van inslikken, dienen Corsodyl tandgel niet te worden doorgeslikt en niet te worden toegediend aan kleine kinderen.
- Nergens anders dan in de mond gebruiken. Indien Corsodyl tandgel in de ogen of oren terecht komt, direct uitspoelen met veel water.
- Corsodyl tandgel vervangt de gewone tandpasta niet.
- Sommige tandpasta's kunnen de werking van chloorhexidine, de werkzame stof in Corsodyl tandgel, nadelig beïnvloeden. Spoel de mond na het tandenpoetsen zeer goed na met water om tandpastaresten te verwijderen en wacht 5 minuten voordat u Corsodyl tandgel gebruikt. U kunt Corsodyl tandgel ook op een ander tijdstip van de dag gebruiken. Tevens is het raadzaam voor Corsodyl tandgel een tandenborstel te gebruiken die niet voor tandpasta is gebruikt.
- Stop het gebruik van de tandgel en raadpleeg uw (tand)arts of apotheker als u last krijgt van pijn of irritatie van de mond.

- Aanvankelijk kunnen er stoornissen in de smaakwaarneming optreden. Ook komt een branderig gevoel van de tong voor. Deze verschijnselen verdwijnen meestal bij voortgezet gebruik. Indien ze echter aanhouden, raadpleeg dan een arts of apotheker.

### **Gebruik met andere geneesmiddelen**

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

### **Gebruik van Corsodyl tandgel met voedsel en drank**

Het gelijktijdige gebruik van kleurvormende stoffen, zoals thee, koffie en wijn, kan leiden tot een bruine verkleuring van tong en tanden (zie ook “mogelijke bijwerkingen”). Om tandverkleuring te vermijden kunt u het gebruik van kleurvormende stoffen verminderen en kan poetsen met een gewone tandpasta, of reiniging van het kunstgebit met een kunstgebitreiniger direct vóór het gebruik van Corsodyl tandgel overwogen worden. Er is geen adequate wijze anders dan polijsten om de verkleuring van gebitselementen te doen verdwijnen. De tongverkleuring verdwijnt nadat het gebruik wordt gestopt.

### **Zwangerschap en borstvoeding**

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Corsodyl tandgel kan voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht, overeenkomstig de gebruiksaanwijzing worden gebruikt tijdens de zwangerschap en tijdens de periode van borstvoeding.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Corsodyl tandgel heeft geen invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken.

### **Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Corsodyl tandgel**

Niet van toepassing

## **3. HOE WORDT CORSODYL TANDGEL GEBRUIKT**

De tanden borstelen met ongeveer 2,5 cm gel op een bevochtigde tandenborstel, twee keer per dag gedurende 15 dagen of volgens het advies van de (tand)arts.

### **Wat u moet doen als u meer van Corsodyl tandgel heeft gebruikt dan u zou mogen**

Na inname zal chloorhexidine digluconaat nauwelijks worden opgenomen in het lichaam. Effecten op het lichaam zullen beperkt blijven tot lichte irritatie van de slijmvliezen, mogelijk misselijkheid en braken. Wij adviseren u bij lichamelijke klachten of bij inname van grote hoeveelheden uw arts te raadplegen.

### **Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Corsodyl tandgel te gebruiken**

Gebruik, zodra u merkt dat u vergeten bent Corsodyl tandgel te gebruiken, Corsodyl tandgel alsnog en ga verder met de behandeling zoals beschreven in “Hoe wordt Corsodyl tandgel gebruikt”

### **Als u stopt met het gebruik van Corsodyl tandgel**

Geen bijzonderheden.

## **4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN**

Zoals alle geneesmiddelen kan Corsodyl tandgel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

#### Immuunsysteemaandoeningen:

- Stop met het gebruik van Corsodyl en zoek onmiddellijk medische hulp als u huiduitslag, zwelling van de lippen, tong, keel of gezicht krijgt of moeite heeft met ademen. Dit kunnen symptomen zijn van een ernstige allergische reactie die zeer zeldzaam is.

#### Zenuwstelselaandoeningen:

- Aanvankelijk kunnen er stoornissen in de smaakwaarneming optreden. Ook komt een branderig gevoel van de tong voor. Deze verschijnselen verdwijnen meestal bij voortgezet gebruik. Indien ze echter aanhouden, raadpleeg dan een arts of apotheker.

#### Maagdarmstelselaandoeningen:

- Huidirritatie
- Bruine verkleuring van de tong en tanden. Zie bij “Gebruik van Corsodyl tandgel met voedsel en drank” hoe u dit kunt vermijden.
- Schraalheid, zwelling en pijn van het mondslijmvlies.
- Incidenteel is er zwelling van bepaalde klieren bij het oor gemeld. In alle gevallen verdween deze nadat de toepassing was gestopt.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

### **5. HOE BEWAART U CORSODYL TANDGEL**

Bewaren beneden 25 °C.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Corsodyl tandgel niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en het etiket van de tube achter “Niet te gebruiken na”.

### **6. AANVULLENDE INFORMATIE**

#### **Wat bevat Corsodyl tandgel**

- Het werkzame bestanddeel is chloorhexidine digluconaat.
- De andere bestanddelen zijn pepermuntolie, levomenthol, polyoxyl hydrogenated castor oil (= PEG-40 gehydrogeneerde ricinusolie), isopropylalcohol, natrium acetaat, hydroxypropylcellulose en gezuiverd water.

#### **Hoe ziet Corsodyl tandgel er uit en wat is de inhoud van de verpakking**

Corsodyl tandgel is een vloeibare, heldere, kleurloze gel. Corsodyl tandgel is verpakt in een tube van 50 gram.

#### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

Registratiehouder;

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare B.V.

Huis ter Heideweg 62

3705 LZ Zeist

Fabrikant;

BCM Limited, Thane Road, Nottingham, Nottinghamshire NG 2 3AA, Verenigd Koninkrijk of Purna Pharmaceuticals NV, Rijksweg 17, 2870 Puurs, België.

**Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in april 2013.**