

BIJSLUITER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Corsodyl mondspoeling, oplossing voor oromucosaal gebruik 2 mg/ml chloorhexidine digluconaat

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Corsodyl mondspoeling zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:

1. Wat is Corsodyl mondspoeling en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Corsodyl mondspoeling gebruikt
3. Hoe wordt Corsodyl mondspoeling gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Corsodyl mondspoeling
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS CORSODYL MONDSPOELING EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

- Corsodyl mondspoeling bevat chloorhexidine digluconaat. Chloorhexidine digluconaat heeft een bacteriedodende werking en voorkomt het ontstaan van tandplak.
- Corsodyl mondspoeling wordt gebruikt:
 - Ter voorkoming van infecties na tandheelkundige en mondchirurgische ingrepen.
 - Voor algemene mondhygiëne indien de tanden door enige handicap (zoals na mondoperaties of bij geestelijk of lichamelijk gehandicapten) niet kunnen worden gepoetst.
 - Voor kortdurende toepassing bij tandvleesontsteking.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U CORSODYL MONDSPOELING GEBRUIKT

Gebruik Corsodyl mondspoeling niet

Als u allergisch (overgevoelig) bent voor chloorhexidine digluconaat, of voor één van de andere bestanddelen van Corsodyl mondspoeling.

Wees extra voorzichtig met Corsodyl mondspoeling

- Hoewel er geen nadelige effecten bekend zijn ten gevolge van inslikken, dienen Corsodyl mondspoelingen niet te worden doorgeslikt en niet te worden toegediend aan kleine kinderen.
- Nergens anders dan in de mond gebruiken. Indien Corsodyl mondspoeling in de ogen of oren terecht komt, direct uitspoelen met veel water.
- Sommige tandpasta's kunnen de werking van chloorhexidine, de werkzame stof in Corsodyl mondspoeling, nadelig beïnvloeden. Spoel de mond na het tandenpoetsen zeer goed na met water om tandpastaresten te verwijderen en wacht 5 minuten voordat u Corsodyl mondspoeling gebruikt. U kunt Corsodyl mondspoeling ook op een ander tijdstip van de dag gebruiken.
- Stop het gebruik van de mondspoeling en raadpleeg uw (tand)arts of apotheker als u last krijgt van pijn of irritatie van de mond.
- Aanvankelijk kunnen er stoornissen in de smaakwaarneming optreden. Ook komt een branderig gevoel van de tong voor. Deze verschijnselen verdwijnen meestal bij voortgezet gebruik. Indien ze echter aanhouden, raadpleeg dan een arts of apotheker.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Gebruik van Corsodyl mondspoeling met voedsel en drank

Het gelijktijdige gebruik van kleurvormende stoffen, zoals thee, koffie en wijn, kan leiden tot een bruine verkleuring van tong en tanden (zie ook “mogelijke bijwerkingen”). Om tandverkleuring te vermijden kunt u het gebruik van kleurvormende stoffen verminderen en kan poetsen met een gewone tandpasta, of reiniging van het kunstgebit met een kunstgebitreiniger direct vóór het gebruik van Corsodyl overwogen worden. Er is geen adequate wijze anders dan polijsten om de verkleuring van gebitselementen te doen verdwijnen. De tongverkleuring verdwijnt nadat het gebruik wordt gestopt.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Corsodyl mondspoeling kan voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht, overeenkomstig de gebruiksaanwijzing worden gebruikt tijdens de zwangerschap en tijdens de periode van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Corsodyl mondspoeling heeft geen invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Corsodyl mondspoeling

Niet van toepassing

3. HOE WORDT CORSODYL MONDSPOELING GEBRUIKT

- Corsodyl mondspoeling wordt onverdund gebruikt.
- Spoel tweemaal per dag gedurende één minuut zorgvuldig de mond met 10 ml Corsodyl mondspoeling (één maatdop tot de rand gevuld). Eventueel kan gespoeld worden met een mengsel van 5 ml Corsodyl mondspoeling en 5 ml leidingwater, direct vóór gebruik gemengd (zie onder Bijwerkingen).
- Ter voorkoming van tandvleesontsteking: tweemaal daags 1 minuut spoelen met 10 ml Corsodyl mondspoeling (één maatdop tot de rand gevuld), gedurende 4 weken.
- Raadpleeg een arts of apotheker vóór gebruik bij kinderen onder de 12 jaar.

De tanden mogen niet direct na het spoelen worden gepoetst. Dit dient te gebeuren direct vóór of geruime tijd erna.

Wat u moet doen als u meer van Corsodyl mondspoeling heeft gebruikt dan u zou mogen

Na inname zal chloorhexidine digluconaat nauwelijks worden opgenomen in het lichaam. Effecten op het lichaam zullen beperkt blijven tot lichte irritatie van de slijmvliezen, mogelijk misselijkheid en braken. Wij adviseren u bij lichamelijke klachten of bij inname van grote hoeveelheden uw arts te raadplegen.

Aangezien Corsodyl mondspoeling alcohol bevat, dient u een arts te raadplegen als een kind een grote hoeveelheid heeft ingeslikt.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Corsodyl mondspoeling te gebruiken

Gebruik, zodra u merkt dat u vergeten bent Corsodyl mondspoeling te gebruiken, Corsodyl mondspoeling alsnog en ga verder met de behandeling zoals beschreven in “Hoe wordt Corsodyl mondspoeling gebruikt”

Als u stopt met het gebruik van Corsodyl mondspoeling

Geen bijzonderheden.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Corsodyl mondspoeling bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Immuunsysteemaandoeningen:

- Stop met het gebruik van Corsodyl en zoek onmiddellijk medische hulp als u huiduitslag, zwelling van de lippen, tong, keel of gezicht krijgt of moeite heeft met ademen. Dit kunnen symptomen zijn van een ernstige allergische reactie die zeer zeldzaam is.

Zenuwstelselaandoeningen:

- Aanvankelijk kunnen er stoornissen in de smaakwaarneming optreden. Ook komt een branderig gevoel van de tong voor. Deze verschijnselen verdwijnen meestal bij voortgezet gebruik. Indien ze echter aanhouden, raadpleeg dan een arts of apotheker.

Maagdarmstelselaandoeningen:

- Huidirritatie
- Er kan een bruine verkleuring van de tong en tanden voorkomen. Zie bij “Gebruik van Corsodyl mondspoeling met voedsel en drank” hoe u dit kunt vermijden.
- Schraalheid, zwelling en pijn van het mondslijmvlies. Verdunning van de mondspoeling tot een 0,1% oplossing (5 ml mondspoeling + 5 ml leidingwater, dat direct vóór het gebruik gemengd moet worden), kan deze klachten doen verminderen.
- Incidenteel is er zwelling van bepaalde klieren bij het oor gemeld. In alle gevallen verdween deze nadat de toepassing was gestopt.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U CORSODYL MONDSPOELING

Bewaren beneden 25 °C.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Corsodyl mondspoeling niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en het etiket van de fles achter “Niet te gebruiken na”.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Corsodyl mondspoeling

- Het werkzame bestanddeel is chloorhexidine digluconaat.
- De andere bestanddelen zijn ethanol, pepermuntolie, polyoxyl hydrogenated castor oil (= PEG-40 gehydrogeneerde ricinusolie), sorbitol, kleurstof E 124 en gezuiverd water.

Hoe ziet Corsodyl mondspoeling er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Corsodyl mondspoeling is een heldere, roze oplossing met pepermuntmaak. Een fles Corsodyl mondspoeling bevat 200 ml en is voorzien van een maatdop die, tot de rand gevuld, 10 ml bevat.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder;

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare B.V.

Huis ter Heideweg 62

3705 LZ Zeist

Fabrikant;

Farmaclair

Av. G. de Gaulle 440

F – 14200 Hérouville St Clair
Frankrijk

Deze bijsluiter is goedgekeurd in december 2011.